

사람과 세상을 풍요롭게, 이롭게, **농업을 변화시키는 기업**

한국농업 수호천사 **SG** 한국삼공

“한국**농업** 수호천사”란? : “농업보국”이라는 일념을 내걸고 설립된 SG한국삼공 반세기의 가치를 표현하는 Key-Concept 입니다.

한국삼공은 작물보호제 산업을 선도하고
해외 및 유관사업 분야에서 성장하는 기업이 되었습니다.

한국삼공 핵심가치 **HI! SG**



상생

Harmony

다양한 이해관계자와
함께 지속 성장한다.



혁신

Innovation

최초-최고-차별화를
위해 도전을 지속한다.



실행

Strong action

깊은생각, 강력한 실행
으로 성과를 창출한다.



역량

Good ability

역량을 지속 개발하여
전문성을 확보한다.

SG 한국삼공은 소비자 여러분의 편의를 위하여 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.

고객상담전화
1599-3082

SG한국삼공 홈페이지
www.30agro.co.kr



본 사 : 서울특별시 서초구 강남대로 285 태우빌딩

공 장 : 전라북도 익산시 낭산면 산단구평길 125-22

연구소 : 전라북도 김제시 금구면 콩쥐팔쥐로 788-22

TEL : (02) 2287-2900

TEL : 070-7459-3907

TEL : (063) 546-6081~3

- | | | |
|------------------|---|----------------------|
| ●경기지점 : 우) 14322 | 경기도 광명시 소하로 190 광명G타워 B1115호 | (02) 489-1833~4 |
| ●강원지점 : 우) 26395 | 강원특별자치도 원주시 마재3로 51(무실동) 202호 | (033) 735-9901~2 |
| ●충북지점 : 우) 28619 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 대림로 377 2층 202호 | (043) 267-0883, 0892 |
| ●천안지점 : 우) 31457 | 충청남도 아산시 탕정면 용머리길 16 더콜럼버스 501호 | (041) 556-3080 |
| ●대전지점 : 우) 35382 | 대전광역시 서구 구룡로 137 밀리온빌딩 403호 | (042) 255-4310 |
| ●전북지점 : 우) 54858 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성북로 51-25 지식산업센터 스페이스온 2047호 | (063) 547-1466~8 |
| ●광주지점 : 우) 62232 | 광주광역시 광산구 하남울로 12번하길 15(하남동) YJ타워 502호 | (062) 528-4676~7 |
| ●순천지점 : 우) 57964 | 전라남도 순천시 충효로 7-8 2층 | (061) 723-4676 |
| ●대구지점 : 우) 41545 | 대구광역시 북구 노원로 238 1층 | (053) 423-0941~3 |
| ●안동지점 : 우) 36751 | 경상북도 안동시 강남5길 20-20 지엔빌딩 4층 | (054) 854-6255~6 |
| ●경남지점 : 우) 51391 | 경상남도 창원시 의창구 차릉로 48번길 49(팔용동) 코로지스빌딩 202호 | (055) 252-6609~10 |
| ●제주지점 : 우) 63231 | 제주특별자치도 제주시 남광로2길 7(이도이동) 정준빌딩 2층 | (064) 757-5658~9 |

SG 2025



• 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오. • 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.
• 어린이 손이 닿는 곳에는 놓아두거나 보관하지 마십시오.

사람과 세상을 풍요롭게, 이롭게, 농업을 변화시키는 기업

생명에 뿌리다
농업의 뿌리다

저농약재배 사용약제

저농약농산물 생산자재

병해충종합관리(IPM)에 적합한 수도 육묘상자용 병·해충약

다카바-에스 입 제

육묘상
처리제의 진정한 **强者**




한국농업 수호천사 **SG** 한국삼공

살균 · 살충 (수도) | 차3+4a |

다카바-에스

입제

- 일반명 : 티아디닐(6%) + 클로티아니딘(0.5%)
- 계통 : 티아디아졸카복사마이드계 + 클로로니코티닐계
- 포장단위 : 1kg×20봉, 1kg×20봉



벼 육묘상자처리 장기지속형 살균·살충제

- 장기지속형 살균·살충제 「다카바-에스」
- 토양잔류 및 수질오염 우려가 적어 저농약 재배에 적합
- Slow-Release 타입으로 높은 안정성 확보

적용대상 및 사용량

작 물 명	적 용 병 해 증	사용적기 및 방법	사용약량	안전사용기준	
				시 기	횟 수
벼	깨씨무늬병	이앙 당일 육묘상처리 (★이앙 7일 전 육묘상처리 포함) (■파종시 육묘상처리 포함) (▲파종시 복토훈화처리 포함)	50g/상자	이앙기	1회 이내
	목도열병				
	세균벼알마름병				
	잎도열병*■				
	흰잎마름병				
	벼물바구미*▲				
	벼잎물가파리				
	벼잎벌레				
	벼줄기굴파리				
	애멸구*				

※ 병해충의 발생이 평년 이상으로 대발생 할 경우에는 적용대상 약제를 본답에 추가로 살포하여 주십시오.
※ 「다카바-에스」 입제는 이앙당일 뿐만아니라 이앙 7일 전, 파종시 육묘상 처리에도 등록되어 있어, 편리한 방법으로 처리하기 용이합니다.




「다카바-에스」 입제는

- 슬로우 릴리스 타입으로 출수전까지 도열병 방제효과
- 벼물바구미 등 본답 초기 저온성 해충 동시 방제효과
- 줄무늬마름병을 매개하는 애멸구에 대해 우수한 효과 발휘

「다카바-에스」 입제 구성성분의 용출도 비교

[2010년 SG한국삼공(주) 농업연구소]



* 슬로우 릴리스 타입으로 긴 약효지속효과

“벼 흰잎마름병(白葉枯病)”



증상

잎 가장자리의 한쪽 또는 양쪽에 형성되어 진전되며 잎 가운데 중앙 부분까지 번저 물결모양의 병반으로 확대되고, 시간이 경과되면서 퇴색되어 황백색으로 변하여 말라죽음.

발병조건

- 생육적온은 26~30℃이며 주로 7월 상순~8월 중순경에 발병
- 이상기온(잦은 강우 등)으로 최근 발병시기가 빨라짐
- 질소함량이 높고 규소 함량이 낮은 포장에서 많이 발생



[2008년 9월 12일 전북 익산시 삼기면]

“벼 흰잎마름병” 확산 차단



한산면 동산리



화양면 보현리



화양면 창외리



화양면 추남리

“흰잎마름병” 상습발생지역의 효과적인 방제방법

「다카바-에스」 입제 육묘상 처리

- 이앙 7일전부터 이앙당일까지 살포
- 가장 효과적인 시기는 이앙 3~5일전 육묘상 살포

출수전후

「벼천왕」 유제 또는 「벼천왕골드」 액상 경엽살포

- 흰잎마름병, 목도열병, 세균벼알마름병 등 동시방제

“벼 줄무늬잎마름병(縐葉枯病)”



줄무늬잎마름병 피해증상



줄무늬잎마름병 피해증상



매개충인 애멸구(약충, 성충)



애멸구 방제 필수

증상

잎이 전개되지 않고 비틀린 채로 말리거나 실모양으로 늘어지며, 담록색 또는 황색의 줄무늬가 세로로 길게 생김. 이삭은 불완전 출수 되거나 출수된 이삭은 기형화되어 수확량이 감소됨

애멸구 발생이 많은 조건

- 감수성품종 재배(진부올벼, 일품 등)
- 조기 이앙벼(초기 애멸구의 표적)
- 보리밭 부근(2km이내, 보리 수확후 애멸구 이동)

서남해안 지역의 효과적인 “벼 줄무늬잎마름병(애멸구)” 방제방법

「다카바-에스」 입제 육묘상 처리

- 애멸구 월동량이 많은 경우에는 부직포 벗긴후 살포
- 월동 애멸구 및 초기 비래 애멸구 방제

「빅카드」 액상 또는 「빅애니」 액상 경엽살포

- 「다카바-에스」 입제 처리 30일 전·후 살포
- 비래 애멸구 성충 및 부화 약충 방제