

사람과 세상을 풍요롭게, 이롭게,  
농업을 변화시키는 기업

생명에 뿌리다  
농업의 뿌리다



다년간의 연구로 자신있게 선보입니다

노균병·역병·뿌리혹병약의  
새로운 명품

명작

명작

액상수화제

한국농업 수호천사 SG 한국삼공

노균병·역병·뿌리혹병의 명품

명작

- 일 반 명 : 아미설프롬(13.5%)
- 계 통 : 설펜아마이드계
- 포장단위 : 100mL×50병,  
250mL×40병

액상수화제 | 다4



「명작」액상수화제의 특징



역병·노균병  
우수한 예방효과



탁월한  
확산 저지효과




직접적인 유주자 사멸효과로  
뿌리혹병 방제

“노균병·역병” 효과적인 사용방법

- 01 예방위주로 살포하시고, 비가오기 전, 비가 그친 뒤에 살포해 주시면  
“침투&용출 메카니즘”으로 오랫동안 예방효과를 발휘합니다.
- 02 이미 발병된 경우에는 건전한 작물은 물론 이미 발병된 작물에도 약제를 충분히 살포해주시면  
우수한 “확산저지효과”에 의해 병의 확산이 효과적으로 줄어듭니다.

배추 노균병



인삼 역병



감자 역병



「명작」액상수화제의 적용대상 및 사용량

| 작 물 명                                  | 적 용 병 해                    | 사용적기 및 방법            | 물 20ℓ당<br>사용약량       | 안전사용기준               |                      |              |                   |                        |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------|--|--|--|
|                                        |                            |                      |                      | 시 기                  | 횟 수                  |              |                   |                        |  |  |  |
| 감 귤                                    | 역병                         | 발병전 10일간격 경엽처리       | 10mℓ                 | 수확 21일 전까지           | 4회 이내                |              |                   |                        |  |  |  |
| 감 자                                    |                            | 발병직전 7일간격 경엽처리       |                      | 625mℓ<br>(100mℓ/10a) |                      | 수확 14일 전까지   |                   |                        |  |  |  |
|                                        | <div>적확</div> 역병<br>(무인항공) | 발병초 경엽처리             | 10mℓ                 |                      |                      | 수확 30일 전까지   |                   |                        |  |  |  |
| 갯                                      | 노균병                        | 파종 후 토양전면 10일간격 분무처리 | 20mℓ                 | 2회 이내                |                      |              |                   |                        |  |  |  |
|                                        | 뿌리혹병                       |                      | 발병초 경엽처리             |                      | 10mℓ                 |              |                   |                        |  |  |  |
| 갯기름나물(방풍)                              | 역병                         | 수확 7일 전까지            |                      |                      |                      | 3회 이내        |                   |                        |  |  |  |
| 겨자채 / 고들빼기                             | 노균병                        |                      |                      | 수확 2일 전까지            |                      |              | 1회 이내             |                        |  |  |  |
| 고추(단고추류 포함)                            | 역병                         | 장마직전부터 10일간격 경엽처리    | 10mℓ                 |                      | 2회 이내                |              |                   |                        |  |  |  |
| 고추(잎)                                  |                            | 장마직전 경엽처리            |                      | 발병초 7일간격 경엽처리        |                      | 3회 이내        |                   |                        |  |  |  |
| 근대 / 꽃양배추(잎)                           | 노균병                        | 발병초 경엽처리             | 수확 7일 전까지            |                      |                      |              |                   |                        |  |  |  |
| 냉 이                                    |                            | 발병초 7일간격 경엽처리        |                      |                      | 625mℓ<br>(100mℓ/10a) |              |                   |                        |  |  |  |
| 녹색꽃양배추(브로콜리)                           | 노균병<br>(무인항공기)             |                      |                      | 발병초 경엽처리             |                      | 2회 이내        |                   |                        |  |  |  |
| <div>적확</div> 꽃양배추<br>(브로콜리, 콜리플라워 포함) |                            | 노균병                  | 발병초 7일간격 경엽처리        |                      |                      |              | 3회 이내             |                        |  |  |  |
| 다채(비타민)                                | 역병                         |                      |                      | 발병초 10일간격 경엽처리       | 10mℓ                 | 수확 2일 전까지    |                   |                        |  |  |  |
| 들깨(잎)                                  |                            | 발병초 7일간격 경엽처리        | 발병초 경엽처리             |                      |                      |              | 수확 7일 전까지         |                        |  |  |  |
|                                        | 발병초 10일간격 경엽처리             |                      |                      | 수확 2일 전까지            |                      |              |                   |                        |  |  |  |
| <div>적확</div> 딸 기                      | 노균병                        | 발병초 7일간격 경엽처리        | 10mℓ(2ℓ / m²)        |                      | 수확 30일 전까지           | 2회 이내        |                   |                        |  |  |  |
| 로케트(루꼴라)                               | 역병                         | 발병초 경엽처리             | 10mℓ                 | 수확 7일 전까지            | 3회 이내                |              |                   |                        |  |  |  |
| 망 고                                    | 뿌리썩음병                      | 발병직전 7일간격 토양관주처리     |                      | 10mℓ                 |                      | 수확 14일 전까지   | 3회 이내             |                        |  |  |  |
| 맥문동                                    | 역병                         | 발병초 경엽처리             | 625mℓ<br>(100mℓ/10a) |                      | 정식기                  |              |                   | 1회 이내                  |  |  |  |
| 머 위                                    | 노균병                        | 발병초 7일간격 경엽처리        |                      | 50mℓ                 |                      | 정식전 육묘상 관주처리 | 80mℓ<br>(6.2mℓ/주) |                        |  |  |  |
| 멜 론                                    | 역병                         | 발병초 경엽처리             | 20mℓ<br>(200mℓ/주)    |                      | 정식전 토양관주처리           |              |                   | 150mℓ<br>(100 ℓ / 10a) |  |  |  |
| 무                                      | 노균병                        | 발병초 7일간격 경엽처리        |                      | 정식전까지 토양분무 후 훈화처리    |                      |              |                   |                        |  |  |  |
| 무화과                                    | 역병                         | 발병초 7일간격 경엽처리        |                      |                      |                      |              |                   |                        |  |  |  |
| 배암차즈기(곰보배추)                            | 노균병                        | 발병초 10일간격 경엽처리       |                      |                      |                      |              |                   |                        |  |  |  |
| 배 추                                    |                            | 노균병<br>(무인항공기)       | 정식전 뿌리침지처리           |                      |                      |              |                   |                        |  |  |  |
|                                        | 뿌리혹병                       | 정식전 정식전 토양관주처리       |                      |                      |                      |              |                   |                        |  |  |  |
|                                        |                            | 정식전 토양관주처리           |                      |                      |                      |              |                   |                        |  |  |  |
|                                        |                            | 정식전까지 토양분무 후 훈화처리    |                      |                      |                      |              |                   |                        |  |  |  |

| 작 물 명                 | 적 용 병 해                         | 사용적기 및 방법       | 물 20ℓ당<br>사용약량          | 안전사용기준     |            |                |  |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|------------|----------------|--|
|                       |                                 |                 |                         | 시 기        | 횟 수        |                |  |
| 부 추                   | 노균병                             | 발병초 7일간격 경엽처리   | 10mℓ                    | 수확 7일 전까지  | 3회 이내      |                |  |
| 비 림                   | 흰녹가루병                           | 발병초 경엽처리        |                         |            | 2회 이내      |                |  |
| 사탕무                   | 노균병                             |                 |                         |            |            | 3회 이내          |  |
| 상추(양상추 포함)            |                                 | 발병초 7일간격 경엽처리   |                         |            | 2회 이내      |                |  |
| 생 강                   | 뿌리썩음병                           | 발병초 14일간격 관주처리  | 20mℓ(2ℓ /㎡)             | 수확 21일 전까지 | 5회 이내      |                |  |
| 수박(복수박 포함)            | 역병                              | 발병직전 7일간격 경엽처리  | 10mℓ                    | 수확 14일 전까지 | 4회 이내      |                |  |
| 순 무                   | 노균병                             | 발병초 경엽처리        |                         | 수확 7일 전까지  | 3회 이내      |                |  |
| 순무양배추(콜라비)            |                                 | 발병초 10일간격 경엽처리  |                         |            |            |                |  |
|                       | 뿌리혹병                            | 정식(파종) 전 관주처리   | 20mℓ<br>(0.6ℓ /㎡)       | 파종(정식)기    | 1회 이내      |                |  |
| 시금치                   | 노균병                             | 발병초 7일간격 경엽처리   | 10mℓ                    | 수확 7일 전까지  | 2회 이내      |                |  |
| 순무유채                  |                                 |                 |                         |            | 3회 이내      |                |  |
| 쑥 갓                   |                                 | 수확 14일 전까지      |                         | 4회 이내      |            |                |  |
| 양배추                   |                                 |                 |                         |            |            | 발병초 10일간격 경엽처리 |  |
| 양 파                   | 노균병<br>(무인항공기)                  | 발병초 7일간격 경엽처리   | 1,250mℓ<br>(1.6 ℓ /10a) | 수확 60일 전까지 | 3회 이내      |                |  |
| 열 무                   | 노균병                             | 발병초 경엽처리        | 10mℓ                    | 수확 14일 전까지 | 2회 이내      |                |  |
| 오 이                   |                                 | 발병초 7일간격 경엽처리   |                         | 수확 2일 전까지  | 3회 이내      |                |  |
| 유 자                   | 역병                              | 발병초 경엽처리        |                         | 수확 14일 전까지 |            |                |  |
| 인 삼                   |                                 | 발병초 10일간격 경엽처리  | 13mℓ                    | 수확 21일 전까지 | 4회 이내      |                |  |
| 잔 디                   | 피티움마름병                          | 발병초 7일간격 토양관주처리 | 10mℓ(1ℓ /㎡)             | 발생초기       | -          |                |  |
|                       | <div>적확</div> 피티움마름병<br>(무인항공기) | 발병초 경엽처리        | 625mℓ<br>(100mℓ/10a)    |            |            |                |  |
| 장 미                   | 노균병                             | 발병초 7일간격 경엽처리   | 10mℓ                    | 수확 21일 전까지 | 3회 이내      |                |  |
| 조                     | 잎집무늬마름병                         | 발병초 10일간격 경엽처리  |                         |            | 수확 21일 전까지 | 2회 이내          |  |
| 지 황                   | 뿌리썩음병                           |                 |                         |            |            | 4회 이내          |  |
| 참 깨                   | 역병                              | 발병초 경엽처리        |                         | 수확 14일 전까지 | 3회 이내      |                |  |
| <div>적확</div> 참다래(키위) |                                 |                 |                         |            |            | 수확 2일 전까지      |  |
| 참 외                   | 노균병                             | 발병초 7일간격 경엽처리   |                         | 수확 7일 전까지  | 2회 이내      |                |  |
| 치커리                   |                                 | 발병초 10일간격 경엽처리  |                         | 수확 21일 전까지 | 3회 이내      |                |  |
| 케 일                   |                                 |                 |                         |            |            |                |  |
| 토마토(방울토마토 포함)         | 역병                              | 발병초 7일간격 경엽처리   |                         | 수확 7일 전까지  |            |                |  |
| 파(쪽파 포함)              | 노균병                             |                 |                         | 수확 2일 전까지  |            |                |  |
| 패션프루트                 | 역병                              | 발병초 경엽처리        |                         | 수확 21일 전까지 |            |                |  |
| 해바라기                  | 노균병                             |                 |                         | 수확 7일 전까지  |            |                |  |
| <div>적확</div> 호 프     |                                 |                 |                         | 수확 14일 전까지 |            |                |  |

## 「명작」 액상수화제 간편한 뿌리혹병 체계처리 방법

### 「명작」 분제 또는 세립제 살포 (정식전 토양훈화)



- 뿌리혹병 밀도감소
- 살포량 : 20kg 1포/10a

### 「대포」 입제 살포 (정식 1 일전~당일)



- 벼룩잎벌레, 진딧물 동시방제
- 살포량 : 1kg 1봉으로 10a에 정식하는 모판상자에 살포

### 「명작」 액상 “육묘상” 관주(정식 1일전~당일)



- 살포시기 : 정식 1일 ~ 정식당일
- 희석방법 :
  - 100ml는 1병으로 물 25l에 희석하여 128구 30상자에 육묘상 관주처리
  - 250ml는 1병으로 물 62l에 희석하여 162구 60상자에 육묘상 관주처리


### 정식



## “침투 & 용출” 메카니즘 효과

「명작」 액상수화제는 살포직후 빠르게 잎 표면의 큐티클층을 뚫고 **침투**되어 큐티클층 하단부에 고르게 자리를 잡습니다. 이후 병원균의 감염에 필요한 다습조건(이슬, 강우 등)이 조성되면 약제가 큐티클층 위로 서서히 **용출**되고, 잎 위의 수분에 약제 성분이 스며들어 병원균을 사멸시킵니다.

「침투&용출 메카니즘」에 의해  
「명작」 액상수화제는 강한 내우성과  
오랜 약효지속 효과를 발휘합니다.



# 「명작」은 어떻게 작용하는가?

「명작」 ‘분제’/ ‘세립제’와 ‘액상수화제’는 토양중에 ‘뿌리혹병’ 휴면포자에서 발아하는 유주자를 직접 공격하여 ‘뿌리혹병’을 예방하며, 포장 내 ‘뿌리혹병’ 밀도를 줄여줍니다.



한국농업 수호천사 **SG** 한국삼공

SG 한국삼공은 소비자 여러분의 편의를 위하여 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.

고객상담전화  
1599-3082

본 사 : 서울특별시 서초구 강남대로 285 태우빌딩  
공 장 : 전라북도 익산시 낭산면 산단구평길 125-22  
연구소 : 전라북도 김제시 금구면 콩쥐팔쥐로 788-22

TEL : (02) 2287-2900  
TEL : 070-7459-3907  
TEL : (063) 546-6081~3

SG 한국삼공  
홈페이지에는 다양한  
정보가 있습니다.  
[www.30agro.co.kr](http://www.30agro.co.kr)

경기지점 : 우) 14322 경기도 광명시 소하로 190 광명G타워 B115호  
강원지점 : 우) 26395 강원특별자치도 원주시 마재3로 51(무실동) 202호  
충북지점 : 우) 28619 충청북도 청주시 서원구 남이면 대림로 377 2층 202호  
천안지점 : 우) 31457 충청남도 아산시 탕정면 용머리길 16 더플러빌 501호  
대전지점 : 우) 35382 대전광역시 서구 구룡로 137 밀리온빌딩 403호  
전북지점 : 우) 54858 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성북로 51-25 지식산업센터 스페이스온 2047호  
광주지점 : 우) 62232 광주광역시 광산구 하남울로 12번길 15(하남동) YJ타워 502호  
순천지점 : 우) 57995 전라남도 순천시 순천만정원로 86 지플레이스 301호  
대구지점 : 우) 41545 대구광역시 북구 노원로 238 1층  
안동지점 : 우) 36751 경상북도 안동시 강남5길 20-20 지엔빌딩 4층  
경남지점 : 우) 51391 경상남도 창원시 의창구 차룡로 48번길 49(팔용동) 코로지스빌딩 202호  
제주지점 : 우) 63231 제주특별자치도 제주시 남광로2길 7(이도이동) 정준빌딩 2층

(02) 489-1833~4  
(033) 735-9901~2  
(043) 267-0883, 0892  
(041) 556-3080  
(042) 255-4310  
(063) 547-1466~8  
(062) 528-4676~7  
(061) 723-4676  
(053) 423-0941~3  
(054) 854-6255~6  
(055) 252-6609~10  
(064) 757-5658~9