

사람과 세상을 풍요롭게, 이롭게,
농업을 변화시키는 기업

생명에 뿌리다
농업의 뿌리다



‘수확당일’에도
사용 가능한
‘천연식물보호제’

「프로블라드」액제

한국농업 수호천사 SSG 한국삼공

수확 당일에도 사용 가능한 **천연식물보호제**



프로블라드 액제

• 일반명 : 블라드 20% • 포장단위 : 100ml x 50병, 250ml x 40병



「프로블라드」액제의 특징

콩과 작물에서 추출한 천연식물보호제	천연식물보호제로 잔류도 FREE~
세균성병해와 진균성병해 동시방제	개화기 사용 O.K 민감한 개화 시기(만개기 포함)에도 뛰어난 안전성으로 살포 가능


「프로블라드」액제의 적용대상 및 사용량

작물	적용병해	사용시기 및 사용방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
배 사과	검은별무늬병	발병초기 경엽처리	10㎖	개화초기	—
	화상병	개화초기 7일간격 경엽처리			
	갈색무늬병				
고추 (단고추류 포함)	잿빛곰팡이병	발병초기 경엽처리	20㎖	발생초기	
들깨					
딸기	발병초 7일간격 경엽처리				
복숭아	잿빛무늬병	발병초기 경엽처리	10㎖		
뽕나무 (오디)	균핵병	개화5일전 및 개화후 경엽처리			
상추 (양상추 포함)		발병초기 7일간격 경엽처리	20㎖		
오이	잿빛곰팡이병				
자두	주머니병	개화전 및 낙화후 경엽처리	10㎖		
토마토 (방울토마토 포함)	잿빛곰팡이병	발병초기 7일간격 경엽처리	20㎖		
포도		발병초 7일간격 경엽처리			

‘BLAD’는?


[BLAD] = *Banda de Lupinus Albus Doce*

콩과식물인 *Lupinus Spp*의 종자에서 발아단계 중에만 일시적으로 생성되는 β -컨글루틴 단백질을 가장 순도가 높은 시기에 추출한 “천연식물보호제”



**'BLAD'의 주요성분은 발아 시작 후 4일에서 12일 사이
한정된 기간에만 추출가능**

「프로블라드」액제의 작용기작



① 세포내 금속 항상성 파괴

BLAD는 세포내 아연과 철에 결합하여
각종 효소의 기능을 마비시킴
(세포 기능 상실 및 사멸)

② 세포내 산화 스트레스 증가

항산화 효소의 기능을 마비시킴
(활성산소가 급증하여 세포 자체를 공격하고,
기능상실, 변형, 조직 괴사 유발)

「프로블라드」액제의 처리효과

사과 - 개화초기 살포

주소 : 충북 괴산군 / 품종 : 사과(홍로) / 살포일자 : 2021. 4. 16



4월 16일 (살포 당일)



4월 23일 (살포 7일차)



5월 2일 (살포 17일)

배 - 개화초기 살포

주소 : 경기 남양주시 / 품종 : 배(추황) / 살포일자 : 2021. 4. 15



살포 당일



살포 5일



살포 12일



살포 40일

SG 방제 Tip! 과수 '화상병' 방제방법!

전용 약제를 통한 철저한 관리

수확 후, 낙엽 전

개화전

개화기



아이씨보르도-66디

아이씨보르도-412

* SG 세균박사, 에코샷, 프로블라드 모두 사용 가능



SG 세균박사 액상수화제

아이씨보르도-66디

아이씨보르도-412



에코샷
입상수화제



프로블라드
액제

한국농업 수호천사 **SG** 한국삼공

고객상담전화
1599-3082

홈페이지
www.30agro.co.kr

병 해 중 TALK
무엇이든 물어보세요?
언제, 어디서나, 편리하게!
스마트폰으로 '영농' 상담하세요

