


사람과 세상을 풍요롭게, 아름답게,
농업을 변화시키는 기업

생명에 뿌리다
농업의 뿌리다



고추는 물론 사과에도 우수한
치료전문 종합살균제

스포르곤

수화제

치료전문 탄저병 전문약

[원에 과수 29종 작물 등록]

스포르곤

수화제

원예용 살균제 **사1**



고추 탄저병

배 검은무늬병(흑반병)

감 탄저병

▶일반명 : 프로클로라즈망가니즈(50%) ▶계통 : 이미다졸계 ▶포장단위 : 100g×100봉, 250g×40봉

「스포르곤」수화제는

버섯 전문살균제로 개발된 에르고스테롤 생합성저해(EBI) 치료전문 살균제로, 특이하게 기존의 EBI계 살균제에 **저항성을 나타내는 탄저병에도 우수한 예방 및 치료효과를 발휘하여 탄저병 치료전문 살균제**로 널리 사용되고 있는 원예용 살균제입니다. 다양한 작물의 다양한 병해에 대해 우수한 예방 및 치료효과를 발휘하는 「스포르곤」수화제는 사과, 고추, 딸기, 포도, 복숭아, 감, 수박의 탄저병은 물론 사과의 갈색무늬병, 겹무늬썩음병, 점무늬낙엽병, 기타 과수류의 잣빛무늬병, 검은무늬병, 붉은별무늬병, 인삼과 채소류의 잣빛곰팡이병, 흰가루병, 덩굴마름병 등에 우수한 효과를 발휘하는 다양한 작물의 다양한 병해 방제를 위한 **치료전문 살균제**입니다.

「스포르곤」수화제의 특징

① 탄저병에 대한 우수한 치료효과

고추, 딸기의 탄저병은 물론 사과, 포도, 감 등의 과수에 발생하는 탄저병에 매우 우수한 효과를 발휘하는 치료전문 살균제입니다.

② 강한 침투이행성과 긴 지속효과

강한 침투이행성 약제로 예방 및 치료효과가 우수하고 장기간 효과가 지속됩니다.

③ 내성균에 대한 탁월한 효과

타 약제에 내성을 지녀 효과가 떨어지는 곰팡이 병에도 탁월한 방제효과를 발휘합니다.

④ 사과 4대병해 동시방제효과

사과에 발생하는 주요 4대 병해인 탄저병, 점무늬낙엽병, 갈색무늬병, 겹무늬썩음병의 동시방제 효과가 탁월합니다.

⑤ 우수한 안전성과 효과

고추, 수박 등의 채소작물은 물론 사과, 감, 복숭아, 포도 등의 과수에 안전하여 효과적으로 사용할 수 있으며, 특히 버섯에 발생하는 푸른곰팡이병과 마이코곤병 그리고 난(蘭)과 인삼에 발생하는 병해에도 우수한 효과를 발휘합니다.

적용대상 및 사용방법

작 물 명	적 용 병 해	사용적기 및 방법	물 200당 사용약량	안전사용기준	
				시 기	횟 수
감 (단감 포함)	등근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리	10g	수확 14일 전까지	4회 이내
	탄저병	6월 중순부터 10일간격 경엽처리			
감 귤	녹색곰팡이병	수확 후 선과 시 왁스 원액에 해당 농약을 희석배수에 따라 왁스코팅기로 과실표면에 골고루 살포한(약25㎖/과실10kg) 후 풍건		수확기	2회 이내
	푸른곰팡이병				
	저장병	수확 7일전 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내
	적확 잣빛곰팡이병	발병초 경엽처리			3회 이내
적확 고구마	덩굴썩김병	정식직후 관주처리	10g(1ℓ/㎡)	정식기	1회 이내
고 추 (단고추류 포함)	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리	10g	수확 3일 전까지	3회 이내
	흰가루병				

적용대상 및 사용방법

작 물 명	적 용 병 해	사용적기 및 방법	물 200당 사용약량	안전사용기준		
				시 기	횟 수	
느타리버섯	푸른곰팡이병	배지 살균전 균상표면처리	20g(2ℓ/㎡)	종균 접종전	1회 이내	
대추	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리	10g	수확 14일 전까지	3회 이내	
적확 더덕	탄저병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 60일 전까지	1회 이내	
적확 도라지	꽃색음병	발병초 경엽처리		수확 7일 전까지	3회 이내	
딸 기	적확 꽃곰팡이병	개화직전부터 7일 간격 경엽처리		10g(100㎖/주)	수확 3일 전까지	2회 이내
	시들음병	정식직전부터 10일간격 관주처리	10g	정식후 20일 이내		
	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 3일 전까지		
	탄저병					
	흰가루병					
적확 마늘	잎마름병	발병초 10일간격 경엽처리	10g	수확 30일 전까지	2회 이내	
망고	잿빛곰팡이병			수확 14일 전까지	3회 이내	
맥문동	붉은점무늬병			수확 21일 전까지		
머루	탄저병			수확 14일 전까지		
배	검은무늬병			수확 14일 전까지	4회 이내	
	검은별무늬병					
복분자	점무늬낙엽병	발병초 7일간격 경엽처리	10g	수확 7일 전까지	3회 이내	
	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리				
사과	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	10g	수확 21일 전까지	4회 이내	
	점무늬낙엽병					
	탄저병	6월상순부터 10일간격 경엽처리				
	검무늬씩음병					
적확 산딸기	점무늬낙엽병	발병초 경엽처리	10g	수확 7일 전까지	3회 이내	
수박	덩굴마름병	발병초 7일간격 경엽처리	10g			
	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리				
양송이버섯	마이코곤병	복토 3~4일후 복토전면처리	20g(0.6ℓ/㎡)	수확 10일 전까지	1회 이내	
양앵두(체리)	잿빛무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	10g	수확 7일 전까지	3회 이내	
양파	적확 시들음병	월동후 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내	
	적확 시들음병(관주처리)	파종(정식) 전 육묘상 관주처리				10g(1ℓ/㎡)
	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리	10g			
적확 에케베리아(모닝듀)	검은점무늬병	발병초 경엽처리		10g	발병초기	—
적확 오렌지	저장병	수확 전 경엽처리			수확 7일 전까지	2회 이내
인삼	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리	20g		수확 14일 전까지	5회 이내
작약	줄기씩음병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 30일 전까지		
	탄저병		10g			
착색단고추(관주처리)	붉은씩음병	발병초 10일간격 관주처리	20g(150㎖/주)	수확 7일 전까지	3회 이내	
파(쪽파 포함)	녹병	발병초 10일간격 경엽처리	10g			
포도	탄저병			수확 14일 전까지	3회 이내	
	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리				
호접란	줄기씩음병		발병초 7일간격 경엽처리	20g	발생초기	—



사과
4대병해
동시방제



탄저병



점무늬낙엽병



갈색무늬병



검무늬썩음병

식용버섯(느타리, 양송이)에 대한 사용방법

예방처리

- 양송이 : 복토 3~4일 후에 3.3㎡당 약제 2g을 물 2ℓ에 희석하여 복토전면에 살포하십시오.
- 느타리 : 배지 살균전에 3.3㎡당 약제 6.6g을 물 6.6ℓ에 희석하여 균상표면에 충분히 살포하십시오.

복합처리(양송이)



- 제1방법 : 상토속에 1.2g/㎡ 정도를 혼합하거나 또는 상토 후 첫관수시 1.2g/㎡를 섞어 뿌리십시오.
그리고 발병이 시작되는 초발이 후 1.2g/㎡를 살포하거나 또는 제2발이 후 1.2g/㎡를 살포하십시오.
- 제2방법 : 복토 후 7일 경과시 스포르곤 수화제 0.6g/㎡를 살포하고 초발이 후 스포르곤
0.6g/㎡를 살포하며 제3발이 후 0.6g/㎡를 다시 살포하십시오.
- 제3방법 : 복토 후 7~9일 경과시 1.2g/㎡를 살포하고 제2발이 후 1.2g/㎡를 재살포하십시오.

SG 한국삼공은 소비자 여러분의 편의를 위하여 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.

고객상담전화
1599-3082

SG한국삼공 홈페이지
www.30agro.co.kr



본 사 : 서울특별시 서초구 강남대로 285 태우빌딩
공 장 : 전라북도 익산시 낭산면 산단구평길 125-22
연구소 : 전라북도 김제시 금구면 공쥐팔쥐로 788-22

TEL : (02) 2287-2900
TEL : 070-7459-3907
TEL : (063) 546-6081~3

경기지점 : 우) 14322	경기도 광명시 소하로 190 광명G타워 B115호	(02) 489-1833~4
강원지점 : 우) 26486	강원특별자치도 원주시 구곡길 72(단구동) 선우빌딩 4층	(033) 735-9901~2
충북지점 : 우) 28618	충청북도 청주시 서원구 성화로69번길 29(죽림동) 죽암빌딩 3층	(043) 267-0883, 0892
천안지점 : 우) 31164	충청남도 천안시 서북구 불당1길 49 신화펠리스 502호	(041) 556-3080
대전지점 : 우) 35382	대전광역시 서구 구봉로 137 밀리온빌딩 403호	(042) 255-4310
전북지점 : 우) 54858	전라북도 전주시 덕진구 만성동 1345-3 지식산업센터 스페이스온 2047호	(063) 547-1466~8
광주지점 : 우) 62232	광주광역시 광산구 하남울로 12번하길 15(하남동) YJ타워 502호	(062) 528-4676~7
순천지점 : 우) 57964	전라남도 순천시 충효로 7-8 2층	(061) 723-4676
대구지점 : 우) 41545	대구광역시 북구 노원로 238 1층	(053) 423-0941~3
안동지점 : 우) 36751	경상북도 안동시 강남5길 20-20 지엔빌딩 4층	(054) 854-6255~6
경남지점 : 우) 51391	경상남도 창원시 의창구 차룡로 48번길 49(팔용동) 코로지스빌딩 202호	(055) 252-6609~10
제주지점 : 우) 63231	제주특별자치도 제주시 남광로2길 7(이도이동) 정준빌딩 2층	(064) 757-5658~9

SG 2024



- 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오. • 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.
- 어린이 손이 닿는 곳에는 놓아두거나 보관하지 마십시오.

주의사항

1. 이 농약은 침투이행성이 강한 이미다azole계 농약으로 수박의 신초 절간장 신장이 3~4일간 지연될 수 있으나 곧 회복됩니다.
2. 고농도로 살포시 작물의 생육억제 및 어린잎에 엽소현상을 일으키는 경우가 있으니 반드시 희석배수 및 사용량을 지켜 사용하시고 연용해서 살포하지 마십시오.
3. 특히, 유묘기에 사용하거나 수박 이외의 호로과 작물에 사용할 경우에는 절간장 생육억제 현상이 있을 수 있으니 사용하지 마십시오.
4. 이 농약은 고춧잎을 식용으로 수확하고자 재배하는 경우에는 사용하지 마십시오. 5. 석회황합제나 석회보르도액 등 알칼리성 약제와는 혼용하지 마십시오.
6. 인삼의 경우 전엽기에는 약해의 우려가 있으니 잎이 완전히 전개 및 경화된 후에 사용하십시오.
7. 복숭아의 경우 품종에 따라 약해가 발생할 우려가 있으니 주의하십시오.