

효과에 효과를 더하다!

넓은 방제스펙트럼
다양한 해충
방제효과



꽃노랑총채벌레

새로운 작용기작
저항성 해충
방제효과



파밤나방

원예용 살충제 [타르보] 유제



아메리카알굴파리

섭식독·접촉독
이중 살충
방제효과



벼룩잎벌레

침탈성·내구성
잎 뒷면 해충
방제효과

한국농업 수호천사  한국삼공

총채벌레

나방

굴파리

벼룩잎벌레

응애

「총채벌레」, 「나방」, 「굴파리」, 「벼룩잎벌레」, 「응애」 효과에 효과를 더하다!

타르보

유제

원예용 살충제 | 13+30

- 일 반 명 : 클로르페나피르 (3%) + 플룩사메타마이드 (7%)
- 계 통 : 파이로글 + 메타-디아마이드계
- 포장단위 : 100mL×50병, 250mL×40병

「타르보」 유제의 특징

- 넓은 방제스펙트럼으로 다양한 해충에 우수한 방제효과
- 섭식독 및 접촉독에 의한 이중 살충효과
- 새로운 작용기작으로 저항성 해충에도 탁월한 방제효과
- 약제 살포 후 우수수 떨어지는 빠른 속효성
- 침달성과 내우성이 뛰어나 방제가 어려운 잎 뒷면 해충에도 효과적




「타르보」 효과

약제 처리 시 수축,
이상증상(구토, 발작) 치사



처리 1시간 후



처리 2시간 후



꽃노랑총채벌레



고추 담배나방



아메리카잎굴파리



배추 벼룩잎벌레



파충채벌레



수박 파밤나방



딸기 작은뿌리파리 피해



뿌리응애

▶ 적용대상 및 사용량

작 물 명	적 용 해 충	사용적기 및 방법	물 200당 사용약량	안전사용기준		
				시 기	횟 수	
가 지	아메리카잎굴파리	발생초기 7일간격 경엽처리	10mℓ	수확 3일 전까지	2회 이내	
	오이총채벌레	발생초기 경엽처리		수확 14일 전까지		
감 굴	볼록총채벌레					수확 3일 전까지
고 추 (단고추류 포함)	대만총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리		수확 3일 전까지		
	담배나방	발생초기 10일간격 경엽처리				
	차면지응애	신초피해 발생초기 경엽처리				
국 화	꽃노랑총채벌레	발생초기 경엽처리	발생초기	—		
딸 기	적확 꽃노랑총채벌레		발생초기 10일간격 관주처리	수확 2일 전까지	2회 이내	
	작은뿌리파리	10mℓ(100mℓ/주)				
		적확 점박이응애	발생초기 경엽처리	10mℓ		
마 늘	고자리파리	월동후 관주처리	10mℓ(1ℓ/㎡)	월동후	1회 이내	
	뿌리응애					
무	벼룩잎벌레	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 3일 전까지	2회 이내	
배 추				무잎벌		수확 14일 전까지
		파밤나방		다발생기 경엽처리		
부 추	뿌리응애	발생초기 토양관주처리	10mℓ(2ℓ/㎡)	수확 30일 전까지	1회 이내	
상추(양상추 포함)	꽃노랑총채벌레	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전까지	2회 이내	
	파밤나방			수확 14일 전까지	3회 이내	
수박(복수박 포함)	파밤나방	다발생기 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내	
시금치	꽃노랑총채벌레	발생초기 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내	
양배추	배추좀나방	다발생기 경엽처리	수확 7일 전까지	3회 이내		
양 파	뿌리응애	월동후 관주처리	10mℓ(1ℓ/㎡)	월동후	1회 이내	
오 이	오이총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	10mℓ	수확 3일 전까지	2회 이내	
참 외	꽃노랑총채벌레					
토마토 (방울토마토 포함)	아메리카잎굴파리					
	적확 토마토녹응애	발생초기 경엽처리		수확 14일 전까지		
파(쪽파포함)	파총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	625mℓ(100mℓ/10a)			
	파밤나방(무인항공기)	발생초기 경엽처리				
	파굴파리	유충발생초기 10일간격 경엽처리				10mℓ
	파밤나방	발생초기 10일간격 경엽처리				

▶ 「타르보」 유제는 안전합니다.

• 「타르보」 유제 살포 2일 후 꿀벌, 호박벌 방사 가능

대 상	1일차		2일차		3일차		4일차	
	치사율 (%)	이상 증상	치사율 (%)	이상 증상	치사율 (%)	이상 증상	치사율 (%)	이상 증상
꿀벌	8	A, B	4	N	0	N	－	－
호박벌	10	A	5	N	5.3	N	－	－

이상증상 : N – 정상 A – 약한 영향 B – 보통 영향 C – 심각한 영향

• 「타르보」 유제 고추 꿀벌, 호박벌 벌독성 시험



고추





호박벌 (2일)



꿀벌 (2일)


▶ 「타르보」 유제의 방제효과

「타르보」 유제 직접 살포 시 시간별 효과 (거세미나방 6령충)




* 직접 살포 시 빠른 섭식 저해로 피해를 줄일 수 있습니다.

침지처리 (섭식독) 시간별 효과
(거세미나방 3령충)



* 3령충은 1~2시간 이내, 6령충은 6시간 이내에
현저한 효과가 발현됨

직접살포 시간별 효과
(오이총채벌레)



* 1시간 이후 효과 발현으로 '바이러스' 발생 최소화

SG 한국삼공은 소비자 여러분의 편의를 위하여 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.

고객상담전화
1599-3082

SG한국삼공 홈페이지
www.30agro.co.kr



본 사 : 서울특별시 서초구 강남대로 285 태우빌딩
공 장 : 전라북도 익산시 낭산면 산단구평길 125-22
연구소 : 전라북도 김제시 금구면 공취팔쭈로 788-22

TEL : (02) 2287-2900
TEL : 070-7459-3907
TEL : (063) 546-6081~3

경기지점 : 우) 14322	경기도 광명시 소하로 190 광명G타워 B1115호	(02) 489-1833~4
강원지점 : 우) 26395	강원특별자치도 원주시 마재3로 51(무실동) 202호	(033) 735-9901~2
충북지점 : 우) 28619	충청북도 청주시 서원구 남이면 대림로 377 2층 202호	(043) 267-0883, 0892
천안지점 : 우) 31457	충청남도 아산시 탕정면 용머리길 16 더콜럼버스 501호	(041) 556-3080
대전지점 : 우) 35382	대전광역시 서구 구룡로 137 밀리온빌딩 403호	(042) 255-4310
전북지점 : 우) 54858	전북특별자치도 전주시 덕진구 만성북로 51-25 지식산업센터 스페이스온 2047호	(063) 547-1466~8
광주지점 : 우) 62232	광주광역시 광산구 하남울로 12번하길 15(하남동) YJ타워 502호	(062) 528-4676~7
순천지점 : 우) 57995	전라남도 순천시 순천만정원로 86 지플레이스 301호	(061) 723-4676
대구지점 : 우) 41545	대구광역시 북구 노원로 238 1층	(053) 423-0941~3
안동지점 : 우) 36751	경상북도 안동시 강남5길 20-20 지엔빌딩 4층	(054) 854-6255~6
경남지점 : 우) 51391	경상남도 창원시 의창구 차릉로 48번길 49(팔용동) 코로지스빌딩 202호	(055) 252-6609~10
제주지점 : 우) 63231	제주특별자치도 제주시 남광로2길 7(이도이동) 정준빌딩 2층	(064) 757-5658~9